

Bijlage 3

Search naar bestaande richtlijnen ADHD

Er is in zes verschillende databronnen gezocht naar bestaande richtlijnen over ADHD:

Arts en Apotheker (<http://www.artsenapotheker.nl/richtlijn>)

National Guideline Clearinghouse (<http://www.guideline.gov/>)

GIN (<http://www.g-i-n.net>)

NHS Evidence (<https://www.evidence.nhs.uk/>)

Leitlinien Databank van de Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (<http://leitlinien.net/>)

Trimbos bibliotheek (http://bibliotheek.trimbos.nl/webapp_bibl/)

Databron	Search	Totaalresultaat	Geselecteerd
Arts en Apotheker	ADHD OR add OR attention OR hyperactivity OR hyperkinetic	8	1 (SIGN)
National Guideline Clearinghouse	ADHD OR add OR hyperactivity OR hyperkinetic	8	1 (ICSI)
GIN	ADHD OR add OR attention deficit OR hyperactivity OR hyperkinetic	20	0
NHS	attention deficit and disruptive behavior disorders Limit: guidelines	130	1 (NICE)
AWMF	adhs OR hyperkinetische OR hyperaktivität	4,3,8 resultaten (niet gelijktijdig te zoeken)	0
Trimbos bibliotheek	(ADHD OR add OR hyperactiviteit) AND richtlijnen	3	0

3.1 SIGN richtlijn

In 2009 is in Schotland door de Scottish International Guidelines Network (SIGN) een richtlijn uitgebracht voor ADHD: *Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people; A national clinical guideline*. De richtlijn is vooral gericht op de fase na de diagnostiek, al worden er wel enkele aanbevelingen gedaan over de ADHDelement periode. Er worden geen aanbevelingen gedaan over screeningsinstrumenten.

3.2 ICSI richtlijn

In 2010 kwam het Institute for clinical Systems Improvement (ICSI) met de richtlijn: *Diagnosis and Management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Primary Care*

for School-Age Children and Adolescents. De richtlijn noemt enkele diagnostische instrumenten, die voor deze richtlijn niet van toepassing zijn en twee screeningsinstrumenten die in dit hoofdstuk besproken worden (de CBCL en de CRS).

3.3 NICE richtlijn

In 2009 is de richtlijn van National Institute for Health & Clinical Excellence (NICE) verschenen, over de diagnostiek en management van ADHD bij jeugdigen, jeugdigen en volwassenen. De richtlijn richt zich echter op de fase vanaf de diagnostiek en zal daarom voor deze richtlijn niet meegenomen worden.

In 2009 is de richtlijn van NICE (*National Institute for Health & Clinical Excellence*) verschenen, over de diagnostiek en management van ADHD bij jeugdigen, jeugdigen en volwADHDenen. De richtlijn is beoordeeld aan de hand van het AGREE-beoordelingsformulier en scoorde goed en is hiermee van goede kwaliteit. Omdat deze richtlijn de diagnostiek en behandeling van ADHD bespreekt is deze niet meegenomen in de wetenschappelijke onderbouwing.

In 2009 is in Schotland door de Scottish International Guidelines Network een richtlijn uitgebracht (SIGN) voor ADHD; *Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people; A national clinical guideline*. De richtlijn is vooral gericht op de fase na de diagnostiek, al worden er wel enkele aanbevelingen gedaan over de ADHDsessment periode. Er worden geen aanbevelingen gedaan over screeningsinstrumenten.

In 2010 kwam het Institute for clinical Systems Improvement (ICSI) met de richtlijn: *Diagnosis and Management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Primary Care for School-Age Children and Adolescents*.

De richtlijn noemt enkele diagnostische instrumenten, die voor deze richtlijn niet van toepADHDing zijn en twee screeningsinstrumenten die in dit hoofdstuk besproken worden (de CBCL en de CRS).